

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

16 Juillet 1982

DLP 21-12-82085846
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES ALPES, ALPES DE HAUTES ALPES, BOUCHES DU RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertes : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83

ABONNEMENT ANNUEL : 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N°11

VIGNE

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE -

En Marana et Casinca les éclosions de jeunes larves s'étant poursuivies après le traitement aérien réalisé par le Groupement de Défense, un nouveau traitement doit être effectué impérativement entre le 20 et le 25 Juillet avec un insecticide également actif contre les Tordeuses de la grappe. Dans la région de Patrimonio une application aérienne est prévue à partir du 20 Juillet.

TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Des taux d'attaques importants sont actuellement fréquemment constatés, notamment dans la région Nord d'Aléria où l'on dénombre localement plus de 50 % de grappes parasitées.

Compte tenu de l'hétérogénéité des attaques nous conseillons vivement aux viticulteurs d'effectuer un contrôle dans leurs parcelles.

En situations n'ayant pas encore reçu de traitement curatif, intervenir sans tarder avec un produit à action de choc type parathion si plus de 10 % des grappes hébergent un ou plusieurs vers.

ARBRES FRUITIERS

CICADELLE SUR KIWI -

Un développement important de Cicadelle est actuellement constaté sur kiwi en Casinca. Si nécessaire intervenir avec par exemple l'une des matières actives suivantes :

Azinphos (nombreuses spécialités), méthomyl (Lannate), formothion (Anthio fort), méthidathion (Ultracide), oxydéméton-méthyl (Métasystémox, Anthonox), parathion (nombreuses spécialités), phosalone (Azofène, Zolone), vamidothion (Kilvan, Sépaphid) ou un produit de la famille des pyrèthrinoïdes

MOUCHE DE L'OLIVE -

Le premier vol se poursuit très intensément en zone littorale et les piqûres sont déjà très nombreuses sur Picholine dépassant fréquemment le seuil de 10 % d'olives piquées

Sur Picholine et autres olives à gros fruits, il est conseillé d'intervenir sans tarder en situations non encore protégées, si possible avec un produit à action systémique : diméthoate 30 g M.A./hl (nombreuses spécialités), formothion 40 g M.A./hl (Anthio fort), phosphamidon 30 g M.A./hl (Dimécron)

Dans le cas d'une lutte par appât empoisonné maintenir la protection en espaçant les traitements de 15 jours maximum.

En oliveraie traditionnelle, les olives n'ont pas encore atteint le stade sensible aux piqûres de la Mouche (diamètre au moins égal à 9 mm).

P15

..../....

CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU -

Le vol se poursuit et les attaques sont importantes en toutes situations .
Renouveler la protection sans tarder .

